

VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 DURANTE EL EMBARAZO

¡Infórmese y vacúnese!

La Sociedad de Medicina Materno-Fetal y otros expertos en embarazo recomiendan la vacuna contra la COVID-19 para personas embarazadas y lactantes. A continuación, encontrará respuestas a algunas de las preguntas más comunes que las personas tienen sobre las vacunas y el embarazo:



¿Cuáles son los beneficios de recibir la vacuna contra la COVID-19 durante el embarazo?

- Las vacunas son efectivas para prevenir la enfermedad COVID-19, especialmente la enfermedad grave y la muerte. Con las vacunas de dos dosis, debe recibir ambas dosis para lograr la máxima eficacia.
- La vacunación durante el embarazo puede ayudarla a transferir anticuerpos protectores a su bebé a través de la placenta y la leche materna. Estos anticuerpos pueden reducir la posibilidad de que su bebé contraiga la enfermedad COVID-19.

¿Cuáles son los riesgos conocidos de contraer COVID-19 durante el embarazo?

Las personas embarazadas que contraen COVID-19 tienen más probabilidades de enfermarse gravemente que las que no están embarazadas. Ellas tienen:

- 3 veces más probabilidades de necesitar atención en la UCI
- de 2 a 3 veces más probabilidades de necesitar soporte vital avanzado y un tubo de respiración
- Más probabilidades de morir de COVID-19

¿Cuáles son los riesgos conocidos de recibir la vacuna COVID-19 durante el embarazo?

- Más de 139.000 personas han recibido la vacuna COVID-19 durante el embarazo. No se han informado problemas de seguridad para las personas embarazadas vacunadas o sus bebés.
- De 800 embarazadas vacunadas en el primer trimestre, no ha habido mayores riesgos de pérdida del embarazo, problemas de crecimiento o defectos de nacimiento en comparación con las personas embarazadas que no fueron vacunadas. No se han reportado problemas en las personas vacunadas posteriormente en el embarazo.
- Usted no puede contraer COVID-19 de las vacunas COVID-19.

¿Cuáles son sus riesgos personales de infectarse con COVID-19 durante el embarazo?

Su riesgo de contraer COVID-19 depende de la posibilidad de que entre en contacto con otra persona infectada. Su riesgo puede ser mayor si:

- Vive en un área donde las tasas de infección por COVID-19 son altas, las tasas de vacunación son bajas, o ambas
- Trabaja en el cuidado de la salud
- Trabaja en un lugar donde tiene contacto cercano frecuente o sostenido con personas

Cuando recibe la vacuna:

- Los CDC ofrecen el [verificador de estado de salud V-safe para después de la vacunación](#) que lo controla después de su vacunación. El programa V-safe supervisa la seguridad de las vacunas mediante la recopilación de información de un gran número de personas vacunadas, incluidas las embarazadas.
- Alguien lo llamará desde V-safe para hacer preguntas y obtener más información.
- Es posible que se le solicite que se inscriba en el registro de embarazos con vacunas, que recopila información sobre la vacunación durante el embarazo.