

Colonoscopia Fecha del procedimiento _____ Hora de llegada _____

Enteroscopia de balón – retrógrada

INDICACIONES GENERALES:

- Traiga consigo un carné/cédula de identidad con foto y su tarjeta de seguro médico.
- El anestesiólogo le aconseja que, por su propia seguridad, no fume ni consuma alcohol durante las 48 horas previas a la cirugía.
- Usted deberá llegar acompañado de una persona que se responsabilizará de llevarle a usted a su casa después del procedimiento; y esa persona deberá permanecer en la sala de espera durante el procedimiento. Si usted no llega acompañado de una persona para llevarle conduciendo/manejando a casa, cancelaremos el procedimiento. Durante las 24 horas tras el procedimiento, usted no podrá conducir/manejar un vehículo, operar maquinaria, tomar decisiones legales, ni podrá consumir alcohol.
- Traiga consigo sus voluntades anticipadas y/o su testamento vital (si los tuviese).
- No deberá llevar puesto maquillaje, esmalte de uñas, ni joyas. Antes del procedimiento, deberá entregar sus pertenencias a su familia (gafas/lentes, lentillas, dentaduras postizas, ropa, etc.).
- Si antes del procedimiento a usted le da un resfriado/constipado, dolor de garganta, tos o fiebre, por favor comuníquese a su médico.
- El día del procedimiento, al llegar se registrará en: _____

INDICACIONES DE TOMA DE MEDICAMENTOS:

- Hasta 2 horas antes de llegar al hospital, usted podrá beber líquidos claros (agua, té, café solo, jugo de manzana y bebidas isotónicas como Gatorade); **A NO SER QUE padezca de acidez severa de estómago, broncoaspiración crónica, o de evacuación gástrica retardada; en tal caso, no deberá comer ni beber nada después de la medianoche.**
- **Tenga en cuenta que: la leche, crema/nata y los jugos de frutas cítricas NO SON líquidos claros.**
- La mañana del día del procedimiento no podrá masticar chicle ni comer caramelos.
- Durante los 7 días previos al procedimiento, no podrá tomar suplementos de hierro.
- **A no ser que le hayan indicado lo contrario en su cita preoperatoria, deberá seguir las siguientes indicaciones:**
 - La noche antes y la mañana del día del procedimiento, no tome pastillas antidiabéticas (pastillas para la diabetes).
 - La noche antes del día del procedimiento, disminuya a la mitad la dosis de insulina. La mañana del día del procedimiento, no deberá inyectarse insulina.
 - Tome sus medicamentos para la presión sanguínea, analgésicos, anticonvulsivos, y medicamentos para el mal de Parkinson. Los debe tomar con un sorbo de agua y 2 horas antes de llegar al hospital.
 - Si usted toma aspirina, AINE (antiinflamatorios no esteroideos), o anticoagulantes, por favor notifique al médico que se los recetó para que le dé las indicaciones correspondientes.

INDICACIONES PREVIAS AL PROCEDIMIENTO:

- El día antes del procedimiento, no podrá comer nada. Solamente podrá consumir LÍQUIDOS CLAROS (transparentes). Si no respeta las indicaciones, el procedimiento se cancelará.
- A las 3:00 p.m.: Empiece a beber la primera mitad (1/2) de la botella de GoLytely: un vaso de 8 onzas cada 10 a 15 minutos, hasta beberlo todo. Deberá beberlo todo en el plazo de 1 hora y media (1.5).
- A las 9:00 p.m.: Termine de beber la segunda mitad (1/2) de la botella de GoLytely: un vaso de 8 onzas cada 10 a 15 minutos, hasta beberlo todo. DEBERÁ beberlo todo antes de la medianoche.
- Para mantenerse hidratado, el día antes del procedimiento beba líquidos claros cada hora, hasta la medianoche.

POR FAVOR LLAME AL 352.265.3636 SI:

- Quiere cancelar o cambiar la fecha del procedimiento.
- Tiene preguntas acerca de los preparativos para el procedimiento o sobre los medicamentos.



DO0006

Patient Name:

Patient Identification #: